




Till R.
Lohmeyer



Pilzsuche



stiller Beobachter im Wald - Grasfrosch



Nachbesprechung der Funde



Spitzschuppiger Schirmpilz
(*Lepiota aspera*), giftig.

Ältere Stockschwämmchen
(*Kuehneromyces mutabilis*)



Schmetterlingstramete
(*Trametes versicolor*- unten
Mitte) mit Geweihförmiger
Holzkeule (*Xylaria hypoxylon*-
oben) = schwarze Stäbchen



Schleiereule (*Cortinarius
praestans*) könnte im
Gebiet vorkommen, wurde
aber von einem Gast
mitgebracht.



Koralle (vermutl. *Clavulina cinerea*)

Koralle
(*Clavulina cf. cinerea*)



Buckeltramete
(*Trametes gibbosa*)



Schwefelkopf
(*Hypholoma spec.*)



Erdstern
(*Geastrum spec.*)



Pinselschüppling
(*Pholiota jahnii*.)



Pfifferling
(*Cantharellus spec.*)



Buchen-Speitäubling
(*Russula mairei*)



Pilzgesellschaft auf
Laubholzstumpf mit Flacher
Lackporling (*Ganoderma
applanatum*),
Stockschwämmchen
(*Kuehneromyces mutabilis*)
und *Trametes spec.*

